



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS

POP N. 007 Versão 7	RECOMENDAÇÕES DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - VACINAÇÃO
-------------------------------	---

Data de elaboração: 23/07/2020	Elaborado por: Priscila Sanches Aquino de Oliveira – Enfermeira Sebastião Alves de Souza Filho – Médico Amanda Assunção Sudário – Enfermeira
--	---

Data de revisão: 03/05/2022	Aprovado por: Rita de Cássia Godinho Guimarães Reis – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
------------------------------------	--

1. Objetivos

- Promover a barreira de proteção individual na realização da vacinação

2. Local de Utilização

- Sala de vacina e locais de trânsito do paciente na UBS

3. Responsáveis

- Todos os profissionais da UBS envolvidos na vacinação

4. Materiais necessários

- Máscara cirúrgica

5. Descrição do Procedimento

- Lavar as mãos.
- Divisão de tarefas de modo que o número de profissionais diretamente dedicados à vacinação não gere aglomeração (**sugere-se** que se tenha um organizador de fila, um ou 2 anotadores, um preparador e um aplicador).
- Todos os profissionais envolvidos deverão utilizar máscara, utilizada conforme descrito no POP 001.
- Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados como canetas, pranchetas e telefones e higienizá-los com álcool à 70% caso o compartilhamento seja indispensável.
- Estabelecer critérios de triagem para identificação de pacientes com sintomas respiratórios, de modo que estes não sejam vacinados neste momento, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.
- A organização da fila de espera deve observar o distanciamento entre os pacientes de, no mínimo, 1 metro.
- Realizar a vacina no paciente.
- Após a finalização da vacinação deve-se higienizar as mãos.
- Proceder ao registro.
- Manter os ambientes ventilados.

Obs: - Os óculos de proteção ou protetor facial podem ser utilizados quando disponíveis.
Luvas não são recomendadas para a atividade de vacinação e não devem substituir a correta higienização das mãos.

6. Fatores de risco

- A falta de uso de qualquer dos EPI e/ou uso inadequado acarreta danos à saúde ocupacional por exposição a secreções do paciente que podem ser potencialmente contaminadas.

7. Referências

- ANVISA. Nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). Atualizada em 08/03/2022. Acesso em: 03/05/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nt-04-2020-para-publicacao-09-03-2022-final.pdf/view>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais Versão 1. Brasília - DF. Abril de 2021. Acesso em: 03/05/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/recomendacoes-de-protecao-aos-trabalhadores-do-servico-de-saude.pdf/view>
- Sociedade Brasileira de Imunização. COVID-19. O que muda na rotina das imunizações. 1ª Edição. Acesso em 03/05/2022. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/cartilha-campanha-sbim-sbp-unicef-200611b-web.pdf>