



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS  
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS

<b>POP</b> <b>N. 003</b> Versão 2	<b>RECOMENDAÇÕES NO COMBATE À MPOX - PARAMENTAÇÃO</b>
<b>Data de elaboração:</b> 01/09/2022	<b>Elaborado por:</b> Amanda Assunção Sudário – Enfermeira Laura Guimarães Vargas – Estagiária de Enfermagem Sabrina Ferreira Pires – Estagiária de Enfermagem
<b>Data de revisão:</b> 01/12/2022	<b>Aprovado por:</b> Denicy de Nazaré Pereira Chagas – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
<b>1. Objetivos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Promover orientação sobre a colocação dos EPI - paramentação.</li></ul>	
<b>2. Local de Utilização</b> <ul style="list-style-type: none"><li>UBS, domicílio ou outros equipamentos no território da UBS.</li></ul>	
<b>3. Responsáveis</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Todos os profissionais da UBS.</li></ul>	
<b>4. Materiais necessários:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Equipamentos de Proteção Individual (EPI).</li></ul>	
<b>5. Descrição do Procedimento</b> <p>A indicação é que a utilização dos EPI siga a seguinte ordem:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Avental ou capote;</li><li>Máscara cirúrgica (vide POP 001);</li><li>Óculos ou protetor facial;</li><li>Luvas de procedimento.</li></ol> <p><b>Avental</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Vista o avental ou capote primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cintura;</li><li>Certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto, bem como os braços e os punhos.</li></ol> <p><b>Lembre-se:</b> Nunca amarre o avental ou capote pela frente.</p> <p><b>Óculos de proteção ou protetor facial</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico pela parte superior da cabeça. No caso dos óculos, coloque da forma usual.</li></ol> <p><b>Luvas</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Calce as luvas e estenda-as até cobrir o punho do avental de isolamento;</li><li>Troque as luvas sempre que for necessário ou quando for entrar em contato com outro paciente;</li><li>Troque as luvas durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando essa estiver danificada;</li><li>Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas;</li><li>Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas;</li><li>As luvas não devem ser reutilizadas;</li><li>O uso de luvas não substitui a higiene das mãos;</li><li>Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas (vide POP 000).</li></ol>	
<b>6. Fatores de risco</b> <ul style="list-style-type: none"><li>O uso e o descarte inadequados de EPI pode acarretar danos à saúde ocupacional e ao Meio Ambiente.</li></ul>	

## 7. Referências

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N°03/2022 02/06/2022. Orientações para prevenção e controle da Monkeypox nos serviços de saúde, 2022a. Acesso 29/07/2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims-ggues-anvisa-no-03-2022-orientacoes-para-prevencao-e-controle-da-monkeypox-nos-servicos-de-saude>>.
- COFEN. Orientações sobre a colocação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Disponível em: <[http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha\\_epi.pdf](http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf)>. Acesso 31/08/2022.