



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS
Departamento de Desenvolvimento à Saúde - DDAS

POP N. 012 Versão 2	RECOMENDAÇÕES NO COMBATE À MPOX - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
-------------------------------	---

Data de elaboração: 06/09/2022	Elaborado por: Amanda Assunção Sudário – Enfermeira Laura Guimarães Vargas – Estagiária de Enfermagem Sabrina Ferreira Pires – Estagiária de Enfermagem
--	--

Data de revisão: 01/12/2022	Aprovado por: Denicy de Nazaré Pereira Chagas – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
---------------------------------------	--

1. Objetivos
<ul style="list-style-type: none">Realizar a limpeza e desinfecção dos ambientes da UBS.

2. Local de Utilização
<ul style="list-style-type: none">Todos os ambientes da UBS

3. Responsáveis
<ul style="list-style-type: none">Profissional de Serviços Gerais

4. Materiais necessários:
<ul style="list-style-type: none">Máscara cirúrgicaAventalLuva de borracha de cano longoÓculos ou protetor facialBotas impermeáveis

5. Descrição do Procedimento
<ul style="list-style-type: none">Manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas;Não comer ou fumar quando executar tarefas de limpeza;Evitar o uso de adornos durante a execução do trabalho;Usar uniforme durante o trabalho e o equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com as circunstâncias de risco;Preparar previamente todo o material necessário ao procedimento de limpeza e desinfecção a ser executado;Higienizar as mãos (vide POP 000), preferencialmente com água e sabão:<ul style="list-style-type: none">antes de iniciar as tarefas de limpeza;ao constatar sujidade;antes e após uso de toalete;após tossir, espirrar ou assoar o nariz;antes de se alimentar;após término das atividades.Colocar o avental (vide POP 003);Calçar as luvas multiuso para limpeza de superfícies;Colocar a máscara cirúrgica (vide POP 001);Colocar os óculos;Remover o lixo do recinto para os locais devidos, antes de iniciar a limpeza;Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes com hipoclorito de sódio a 0,5% ou álcool 70%;Iniciar pelo mobiliário e/ou paredes e terminar pelo piso;Limpar com movimentos amplos, do lugar mais alto para o mais baixo e da parte mais distante para a mais próxima.

6. Fatores de risco
<ul style="list-style-type: none">A falta e/ou uso inadequado dos EPI pode acarretar danos à saúde ocupacional por exposição a secreções potencialmente contaminadas.

7. Referências

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N°03/2022 02/06/2022. Orientações para prevenção e controle da Monkeypox nos serviços de saúde, 2022a. Acesso 29/07/2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims-ggtes-anvisa-no-03-2022-orientacoes-para-prevencao-e-controle-da-monkeypox-nos-servicos-de-saude>>.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília, 2010.