

# FLUXOGRAMA TESTE RÁPIDO MOLECULAR - TRM-TB\*

- > **Sintomáticos Respiratórios** (presença de tosse seca ou produtiva, por período igual ou superior a 02 SEMANAS). Profissionais de Saúde, contato de TB, Portadores de HIV, População em situação de rua e privados de liberdade, suspeita-se na presença de tosse, independente da duração.
- > **INDICAÇÃO:** Casos Novos, triagem de resistência à rifampicina nos casos de retratamento e triagem de resistência à rifampicina nos casos com suspeita de falência ao tratamento da TB.

ENVIAR JUNTO À AMOSTRA:  
REQUISIÇÃO GAL IMPRESSA  
E FICHA DE  
ENCAMINHAMENTO  
PREENCHIDA DE FORMA  
**COMPLETA**

COLETAR O MATERIAL NO  
MESMO DIA OU AGENDAR  
PARA O DIA SEGUINTE.  
PROTEGER DA LUZ SOLAR.

RESULTADO  
DISPONIBILIZADO NO GAL  
EM ATÉ 24H.

## > ORIENTAÇÕES COLETA ESCARRO:

- Coletar em local aberto. Preferencialmente ao ar livre e com a presença de luz solar.

- 1 Higienize a boca com água;
- 2 Inspire profundamente;
- 3 Prenda a respiração;
- 4 Force a tosse;
- 5 Escarre no pote;
- 6 Repita esse processo por 3 vezes.

VOLUME IDEAL = 5 a 10 ml

## > IDENTIFICAÇÃO DO COLETOR :

- Nome completo (Sem abreviaturas)
- Data da coleta
- Unidade / Serviço de Saúde
- Tipo de amostra: ESCARRO

> VERIFICAR A VEDAÇÃO E ACONDICIONAR EM SACO TRANSPARENTE INDIVIDUAL.

> **A AMOSTRA DEVE IR ACOMPANHADA DA REQUISIÇÃO GAL E FICHA DE ENCAMINHAMENTO.**  
PARA EXAME DE **TSA**: Cadastrar IAL- Teste de sensibilidade antimicrobiana. PARA EXAME DE **Cultura+TSA**: Cadastrar Tuberculose/Micobacteriose.

\* O TRM é um exame para diagnóstico e não deve ser solicitado para acompanhamento e/ou controle durante o tratamento da Tuberculose. O exame para acompanhamento dos casos de TB é o BAAR, **uma** amostra.

Na ausência do exame TRM -TB para diagnóstico, utilizar o BAAR:  
- **Duas amostras** - BAAR/LACEN  
- **Uma amostra** - Cultura/Macro

Contato Laboratório Macrorregional - SRS:  
3257-8833  
labmacro.jfo@saude.mg.gov.br  
Contato LACEN: 3690-7455